

Avertissements agricoles

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 6 C du 06/05/98

GRANDES CULTURES N° 5

BLE DUR :

Rouilles en extension – Oïdium stable

Intervenir si aucun traitement fait à ce jour

BLE TENDRE :

Intervenir si aucun traitement fait à ce jour

POIS :

Cultures précoces déjà traitées : renouveler

Cultures plus tardives non traitées : intervenir

BLES DURS et TENDRES

BLES DURS : Les stades s'échelonnent de la dernière feuille (F1) étalée au début épiaison (la gaine est fendue, l'épi apparaît).

- **La Rouille brune** est bien présente et en extension comme cela pouvait se prévoir compte tenu des conditions météo ; elle est presque absente encore sur F2 (1 à 2 pustules sur les parcelles les plus avancées) mais très active sur la F3.
- **La Rouille jaune** est également présente sur certaines variétés de façon assez importante
- **La Septoriose** est très discrète cette année et sur feuilles inférieures
- **Les Pucerons** sont toujours en colonies sur la végétation et ne manqueront pas de se porter sur les épis

En ce qui concerne les BLES TENDRES la préoccupation essentielle vient de la Rouille jaune qui est en phase explosive actuellement ; les parcelles n'ayant jamais reçu de protection doivent être impérativement traitées (la protection Réal n'agit plus depuis longtemps) car les pertes seraient importantes

Toutes les parcelles non traitées à ce jour, soit que le stade dernière feuille étalée n'était pas atteint, soit que ces cultures étaient indemnes de maladies, doivent être impérativement protégées actuellement car la Rouille brune va rapidement coloniser les étages supérieurs ; cette intervention contrôlera bien sûr la Rouille jaune :

OPUS 1 L/HA

EOLE WG 0.75 Kg

CAPITOLE 1.5 L

Il faut rajouter un insecticide visant les Pucerons

KARATE K 1 L/HA

BEST 1 L

BAYTHROID 0.3 L

TALSTAR 0.05 L

DECIS 0.25 L

Par contre les parcelles traitées selon nos conseils au stade dernière feuille étalée atteint il y a environ 12-15 jours sont indemnes de Rouilles ; le renouvellement interviendra en tout début floraison et pas avant (en utilisant alors Horizon)

POIS PROTEAGINEUX

Compte tenu des conditions météo la floraison de ces cultures s'annonce assez longue, il convient de parfaitement encadrer cette période d'autant que le nombre d'étages foliaire est important

Parcelles non traitées (début floraison) : intervenir avec


CICERO 2 L/HA plus

BEST ou KARATE K 1.25 L

Parcelles déjà traitées depuis 2 semaines renouveler de la même façon

Pour une prise en compte du risque Bruches préférer

TALSTAR à 0.2 L/Ha ou BAYTHROID à 0.6 L



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO - B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél. : 04 67 10 19 50 - Fax : 04 67 03 10 21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'INSCRIPTION 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
Trésor Public de l'Hérault 00001003365